

ALTERNATIVAMENTE PODE-SE ELABORAR UM ISCO À BASE DE MEL, ÁGUA, VINAGRE E ÁLCOOL:

- 1) NUMA PANELA, AQUECER BEM MEIO LITRO DE ÁGUA, DEPOIS ADICIONAR 2 COLHERES (DE SOPA) DE MEL MEXER BEM PARA HOMOGENEIZAR E DEIXAR ARREFECER.
- 2) DEPOIS DE ARREFECER, JUNTAR 2 COLHERES (DE CHÃ) DE VINAGRE + 2 COLHERES (DE SOPA) DE ÁLCOOL ETÍLICO OU AGUARDENTE E MEXER BEM.
- 3) ENCHER A ARMADILHA ATÉ 1/3 DA SUA CAPACIDADE.

NOTA: EM SUBSTITUIÇÃO DO MEL PODE-SE USAR OS RESTOS DA LAVAGEM DE CENTRIGUGADORES + RESTOS DE FAVOS E CERAS RESULTANTES DAS LIMPEZAS DOS QUADROS



SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL

EQUIPA DE VIGILÂNCIA E CONTROLO DA VESPA VELUTINA

vespavelutina@paredesdecoura.pt

TLF: 521 780 100 EXT (4)



COMUNICAÇÃO/DENÚNCIA DE NINHOS PAREDES DE COURA

Plataforma Colaborativa

www.sosvespa.web

Município de Paredes de Coura Balcão Único de Atendimento ao Munícipe

Juntas de Freguesia

Contacte a Junta de Freguesia da sua Área de Residência

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Naio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ř											Fase 1
-		Fase 2									
			ARMADILHA	ARMADILHAS DE PRIMAVERA							
						ÉPOCA DE VERÃO	8				
-									ARMADILHAS DE OUTONO	UTONO	-1
1		Período inve estão numa i	rnal. Não ari fase critica d	Periodo invernal. Não armadilhar. A colocação de armadilhas é ineficaz e corre o risco de capturar outras espécies que estão numa fase crítica do seu seu ciclo biológico e são essenciais para o ecossistema	plocação de a lo biológico e	ırmadilhas é são essenci	ineficaz e co ais para o ec	ossistema	e capturar o	utras espéci	ies que
se 2											
IMADILHAS DE		Surgimento o 500 metros. colonizadas (das fundado 2) As armad num raio de	Surgimento das fundadoras. 1) A colocação das armadilhas deve ser próxima dos ninhos dos anos anteriores, num raio de 500 metros. 2) As armadilhas podem ser colocadas no interior de colmeias em apiários com a possibilidade de serem colonizadas (num año de 30 km). 3) Não colocar em outras áreas	cação das arr ser colocadas ão colocar er	nadilhas dev i no interior o m outras áre:	e ser próxin de colmeias as	na dos ninho em apiários	s dos anos a com a possi	nteriores, no bilidade de s	um raio de erem
		Surgimento o 500 metros. colonizadas (É A FASE CHJ desenvolvim desenvolvim	das fundado 2) As armad Inum raio de NVE. As func ento das poi	Surgimento das fundadoras. 1) A colocação das armadilhas deve ser próxima dos ninhos dos anos anteriores, num raio o 500 metros. 2) A a armadilhas podem ser colocadas no interior de colimeias em aplários com a possibilidade de serem colonizadas funar naio de 30 km). 3) Não colocar em outras áreas É A FASE CHAVE. As fundadoras procuram alimento açucarado. A captura de outros insectos não perturba o deservolvimento das populações. Esta ação interrompe o cido de desenvolvimento da vespa e diminui a predação em aplários. Os ninhos primários devem ser localizados e destruídos.	cação das arr ser colocadas ão colocar er uram aliment a ação interr ser localizado	nadilhas dev i no interior o n outras área o açucarado. ompe o ciclo os e destruído	e ser próxim de colmeias as . A captura c o de desenvo	na dos ninho em apiários de outros ins	s dos anos a com a possí ectos não possí a vespa e din	nteriores, nu bilidade de s erturba o ninui a pred	ım raio de erem ação em
OCA DE VERÃO		Surgimento o Surgimento o Son metros. Colonizadas (das fundado 2) As armad (num raio de AVE. As func ento das po ninhos prim strução dos	Surgimento das fundadoras. 1) A colocação das armadilhas deve ser próxima dos i 500 metros. 2) As armadilhas podem ser colocadas no interior de colomelas em api colonizadas (num naio de 30 km). 3) Nãos colocar em outras áreas É A FASE CHAVE. As fundadoras procuram alimento açucarado. A captura de outro desenvolvimento das populações. Esta ação interrompe o cido de desenvolvimento apiários. Os ninhos primários devem ser localizados e destruidos. Inicio da construção dos ninhos secundários. O alimento açucarado é desprezado. Inicio da construção dos ninhos secundários.	cação das arricer colocadas ier colocar er a colocar er a ação intern ier localizado dários. O alir	nadilhas dev i no interior c n outras área o açucarado, o ompe o ciclo is e destruído nento açuca	e ser próxim de colmeias as . A captura c r de desenvo os.	em apiários de outros ins de outros da de coutros ins	s dos anos a com a possi ectos não pi vespa e din	niteriores, ni pilidade de s erturba o ninui a predi	ım raio de erem ação em

AS DIFERENTES ÉPOCAS DE COLOCAÇÃO DE ARMADILHAS



MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL

EQUIPA DE VIGILÂNCIA E CONTROLO

DA VESPA VELUTINA

OFICINA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMADILHAS

PARA

CAPTURA DE VESPA ASIÁTICA



